



FICHA TÉCNICA

DUO DUALET

Insecticida agrícola

Microencapsulado.

Producto registrado: RSCO-MEZC-1105-0156-009-36.17

COMPOSICION PORCENTUAL	Porcentaje en peso
CLORPIRIFOS ETIL: O,O-dietil O-3,5,6-tricloro-2-piridil fosforotioato (Equivalente a 350 g de i.a./L a 20 °C)	31.65
PERMETRINA: 3-fenoxibencil (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilto (Equivalente a 50 g de i.a./L a 20 °C)	4.52
INGREDIENTES INERTES Emulsificantes, solvente, impurezas y compuestos relacionados	63.83
TOTAL	100.00



**TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN
TÓXICO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **3 PELIGRO**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

DUO DUALET le recomienda aplicar en los siguientes cultivos para el control de las plagas que se indican en el siguiente cuadro.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/Ha	INTERVALO DE SEGURIDAD* (Días)*	OBSERVACIONES
Chile	Picudo del Chile (<i>Anthonomus eugenii</i>)	0.75-1.0	7	Aplicar cuando aparezcan los primeros adultos
Jitomate	Minador de la hoja (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	1.5 - 2.0	1	Aplicar cuando se tenga de 20-25% de hojas minadas (con larvas)
Maíz Sorgo	Gusano cogollero (<i>Spodoptera Frugiperda</i>)	0.75-1.0	21	Aplicar de preferencia sobre estadios iniciales, cuando se tenga 25% de plantas dañadas. En ambos cultivos, dirigir la aplicación al cogollo



* Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS: 24 horas después de la aplicación.

LMR:

Cultivo	Clorpirifos	Permetrina
Soya	0.3 mg/Kg	0.05 mg/Kg
Jitomate	0.5 mg/Kg	2.0 mg/Kg
Chile	0.5 mg/Kg	0.05 mg/Kg
Algodonero	0.2 mg/Kg	0.05 mg/Kg
Maíz	8.0 mg/Kg	50 mg/Kg
Sorgo	0.5 mg/Kg	0.05 mg/Kg

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Estimar la dosis de plaguicida y el gasto de agua del equipo a utilizar sobre la superficie a tratar, a fin de evitar remanente de producto diluido. Llene el tanque de aplicación hasta 1/2 de su capacidad, agréguese el producto y complete el volumen.

Mantenga en constante agitación. Aplíquese en forma de aspersión usando cualquier tipo de equipo terrestre que asegure un buen cubrimiento de las áreas infestadas. Generalmente en aplicaciones terrestres se utilizan de 200 a 400 L/ha de agua, dependiendo del equipo, la intensidad de la infestación y el tamaño de la planta.

CONTRAINDICACIONES: No aplique cuando el viento sea muy fuerte (>15 km/hr), ni a temperaturas muy altas (>35 °C).

FITOTOXICIDAD. Este producto no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas bajo las anteriores instrucciones de uso.

INCOMPATIBILIDAD. No mezclar con otros productos, aplíquese solo.