

# AGGA

## Insecticida agrícola

Concentrado Emulsionable.

Producto registrado: RSCO-INAC-0177-0693-009-6.53

COMPOSICION PORCENTUAL	Porcentaje en peso
<b>LAMBDA CYHALOTRINA:</b> R)-a -ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato y (S)-a-ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato. <b>Equivalente a 60 g de i.a./L (a 20°C)</b>	6.53
<b>INGREDIENTES INERTES</b> Emulsificante, surfactante y solvente.	93.47
<b>TOTAL</b>	100.00



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 PRECAUCIÓN**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

AGGA es un insecticida piretroide de acción por contacto e ingestión, con efecto de choque y persistencia.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Jitomate (5)*	Gusano del fruto ( <i>Heliothis zea</i> )	0.4 – 0.5	Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 370-470 L de agua/ha.
Aguacatero (14)*	Trips ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	400-500 mL/ha	Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 950-1050 L de agua/ha
Maíz (15)*	Gusano cogollero ( <i>Spodoptera frugiperda</i> )	0.25-0.30	Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 550-650 L agua/ha

\*( ) Intervalo de seguridad: Número de días que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS:** 6 horas después de la aplicación.

**LMR (EPA):**

Jitomate	0.1 mg/Kg
Aguacatero	0.2 mg/Kg
Maíz	0.05 mg/Kg

**MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** Para abrir el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras. Agregue la dosis recomendada de AGGA en la mitad de agua requerida para su aplicación, agite y adicione la cantidad de agua restante. Las aplicaciones deberán efectuarse usando tanta agua como sea necesario para lograr un cubrimiento completo del follaje, según se emplee equipo terrestre o aéreo.

**CONTRAINDICACIONES:** Las aplicaciones no deben realizarse cuando la velocidad del viento sea mayor de 10 km/hr, para evitar deriva del producto.

**FITOTOXICIDAD:** Este producto no es fitotóxico para los cultivos a las dosis aquí recomendadas.

**INCOMPATIBILIDAD:** Para las mezclas que se realicen con otros productos, se recomienda utilizar los que cuenten con registro autorizado y vigente para los cultivos indicados en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad física previa a la aplicación.