

# PERALT

Insecticida agrícola

*Concentrado emulsionable.*

Producto registrado: RSCO-INAC-0156-013-009-035

COMPOSICION PORCENTUAL	Porcentaje en peso
<b>PERMETRINA:</b> 3-Fenoxibencil (1RS)-cis, trans-3-(2,2diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato (60% de isómero trans y 40% de isómero cis) (Equivalente a 344 g de i.a./L a 20 °C)	34.73
<b>INGREDIENTES INERTES</b>	
Diluyentes, emulsificantes y compuestos relacionados.	65.27
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO SI SE INHALA**

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 PRECAUCIÓN**

**ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**INSTRUCCIONES DE USO:  
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

**PERALT®** es un insecticida piretroide formulado como concentrado emulsionable. Actúa por contacto e ingestión, principalmente sobre larvas de lepidópteros y dípteros. La dosis debe ajustarse según el grado de infestación y tamaño del cultivo.

CULTIVO	PLAGA	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS L/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD (días)*
Jitomate	Gusano alfiler	Keiferia lycopersicella	400-600 ml	7
	Gusano del fruto	Heliothis zea		
		H. virescens		
	Gusano soldado	Spodoptera exigua		
	Gusano falso medidor	Trichoplusia ni		
Melón	Gusano del fruto	Heliothis zea	400-600 ml	3
		H. virescens		7
Calabaza	Gusano soldado	Spodoptera exigua		
	Gusano falso medidor	Trichoplusia ni		
	Minador de hoja	Liriomyza munda		
Lechuga	Gusano del cuerno	Manduca spp	400-600 ml	1
Col	Gusano falso medidor	Trichoplusia ni	300-500 ml	1
	Mariposita blanca	Pieris rapae		
	Gusano del corazón de la col	Copitarsia consueta		
	Coliflor			
	Palomilla dorso de diamante			
Col de Bruselas	Gusano soldado	Plutella xylostella		1
Brocolí	Gusano del furto	Spodoptera exigua		1
		Heliothis spp		
Espinaca	Gusano falso medidor	Trichoplusia ni	300-500 ml	7
	Mariposita blanca	Pieris rapae		
	Gusano del corazón de la col	Copitarsia consueta		
	Gusano soldado			
	Gusano del fruto	Spodoptera exigua		
Apio	Gusano falso medidor	Trichoplusia ni	300-500 ml	3
		Heliothis spp		
		Gusano del fruto		
		Gusano soldado		
Chile bell	Gusano falso medidor	Trichoplusia ni	400-600 ml	3

\*Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS:** 24 horas después de la aplicación.

**LMR:**

Jitomate	2.0 mg/Kg
Lechuga	20 mg/Kg
Col	6.0 mg/Kg
Coliflor	0.5 mg/Kg
Col de Bruselas	1.0 mg/Kg
Apio	2 mg/Kg
Espinaca	20 mg/Kg
Brócoli	2.0 mg/Kg
Chile bell	0.50 mg/Kg

**MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.** Con el equipo de protección puesto, llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora. Destape el frasco con cuidado. Haga una pre-mezcla con la cantidad del producto necesario y poca agua. Agite perfectamente y agregue dicha pre-mezcla al tanque o depósito de la aspersora, complete con agua hasta su capacidad, agitando continuamente. Aplique inmediatamente. La dosis recomendada del producto debe diluirse en 200-600 litros de agua limpia.

**CONTRAINDICACIONES.** No se debe aplicar en horas de calor intenso ni cuando la velocidad del viento sea mayor de 15 km/hr.

**FITOTOXICIDAD. PERALT®** no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendados.

**INCOMPATIBILIDAD.** No se recomienda **PERALT®** en mezclas de tanque. Si desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación