

DESCRIPCIÓN

El material consistirá en una mezcla homogénea de Pimetrozina Técnica junto con relleno(s) y cualquier otro formulante necesario. El producto deberá ser un gránulo columnar uniforme y estar libre de materias extrañas visibles y grumos duros.

INGREDIENTE ACTIVO

Pimetrozina

Contenido declarado : 50%

Tolerancia Permitida: $\pm 2.5\%$

PROPIEDADES FÍSICAS

Mojabilidad (MT 53.3)

La formulación se humedecerá completamente en 1 min.

Prueba de tamiz húmedo (MT 185)

Máximo: 1.0% retenido en un tamiz de ensayo de 75 μm . Number: 118016 COA Version 1.1

Suspensibilidad (MT 184.1)

Mínimo del 80 % después de 30 minutos en agua estándar CIPAC D a $25 \pm 5^\circ\text{C}$ 4.4

Espuma persistente (MT 47.3)

Máximo: 60 mL después de 1 min.

IMPUREZAS RELEVANTES

Contenido de agua: 8.0 a 11.0%

FICHA TÉCNICA



ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO

Estabilidad a 54°C (CIPAC MT 46.1.1)

Después del almacenamiento a $54 \pm 2^\circ\text{C}$ durante 14 días, el producto deberá seguir cumpliendo con las cláusulas de: prueba de tamiz húmedo, suspensibilidad, según sea necesario.

Furtivo es un insecticida a para el control de las plagas que de indican a continuación, en los siguientes cultivos:

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Calabacita (0)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>)	0.400 – 0.600 kg/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugiendo 350 – 450 L de agua/ha.
Papa, Chile, Berenjena, Jitomate (14)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>) Pulgón saltador (<i>Bactericera cockerelli</i>)	200 – 800 g/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugiendo 400 L de agua/ha.
Rosal (0)	Pulgón del rosal (<i>Macrosiphum rosae</i>)	200 – 400 g/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 10 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugiendo 400 L de agua/ha.
Gerbera (0)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)		
Brócoli, Col, Coliflor (7)	Pulgón cenizo (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	225 – 450 g/ha	Realizar una aplicación foliar, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugiendo 400 - 600 L de agua/ha.
Melón, Pepino, Sandía (0)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Pulgón del algodón (<i>Aphis gossypii</i>)	200 – 600 g/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten las primeras infestaciones de las plagas; volumen de aplicación sugiendo 400 - 600 L de agua/ha.

Tiempo de reentrada a campos tratados: 24 horas

() Intervalo de Seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.